

MADRID

CALENDARIO DE VACUNACIONES 2008

| VACUNAS | EDAD | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|-------------|--------|--------|--------|---------|--------------|---------|---------|--------------|
| | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 12 meses | 15 meses | 18 meses | 3 años | 4 años | 6 años | 10 años | 11 años | 13 años | 14 años | 16 años |
| Poliomielitis | VPI1 | VPI2 | VPI3 | | | VPI4 | | | | | | | | |
| Difteria-Tétanos-Pertussis | DTPa1 | DTPa2 | DTPa3 | | | DTPa4 | | DTPa5 | | | | | | Td |
| Haemophilus influenzae b | Hib1 | Hib2 | Hib3 | | | Hib4 | | | | | | | | |
| Sarampión-Rubéola-Parotiditis | | | | | TV1 (a) | | | TV2 | | | | | | |
| Hepatitis B | HB3 dosis 2, 4 y 6 ^(b) | | | | | | | | | | | | | |
| Meningitis Meningocócica C | MenC1 | MenC2 | | | MenC3 | | | | | | | | | |
| Varicela | | | | | V V Z (c) | | | | | | V V Z (d) | | | |
| Neumococo (siete serotipos) | PCV7 (1) | PCV7 (2) | PCV7 (3) | | | PCV7 (4) | | | | | | | | |
| Virus del Papiloma Humano | | | | | | | | | | | | | | V P H (e) |

(a) En situación de especial riesgo una dosis a los 12 meses. S

(b) En hijos de madre portadora de AgHbs se administrará la vacuna HB más gammaglobulina dentro de las 12 horas que siguen al nacimiento. Se continuará la vacunación con vacuna hexavalente a los 2,4 y 6 meses de edad.

(c) Niños en riesgo: se puede adelantar a los 12 meses. Las dosis administradas antes de esta edad no deben ser contabilizadas.

(e) Sólo niñas en pauta de 3 dosis (0,1 y 6 ó 0,2 y 6 meses en función de la vacuna administrada).