



Datos relevantes sobre la salud de los españoles



Para

el conjunto de la población, España presenta una esperanza de vida al nacer de 80,5 años, claramente superior a la media de 74,3 años de la UE-27.

Esperanza
de vida




Fuente: Instituto Nacional de Estadística. WHO European health for all database (HFADB) version November 2007.

Percepción subjetiva de la salud

El 75,2% de los hombres y el 65,0% de las mujeres valoran su salud como buena o muy buena.

Autovaloración del Estado de Salud



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo-INE. Encuesta Nacional de Salud de España, 2006.

Hábitos y estilo de vida

En España, un 26,4% de los mayores de 16 años se declaran fumadores diarios y un 20,5% ex-fumadores. El 50,0% dice que nunca ha fumado.

Los hombres que se declaran fumadores diarios son el 31,6% de los mayores de 16 años frente al 21,5% de las mujeres de esa misma edad.

Por grupos de edad el porcentaje de hombres fumadores diarios es más alto en las edades medias que en los más jóvenes. Para las mujeres el grupo más joven supera a los hombres.

Fumadores diarios


Hombres		Mujeres
14,18	65 y +	2,67
34,27	45-64	20,95
38,83	25-44	30,44
24,96	16-24	28,93

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo-INE. Encuesta Nacional de Salud de España, 2006.

La población de 16 y más años que dice haber consumido alcohol en los últimos doce meses supone el 55,7%. Los hombres que declaran haber consumido alcohol es 70,2% frente al 41,8% de las mujeres.

Un 44,3% dice que no ha consumido alcohol en ese periodo de tiempo.

Consumo de bebidas alcohólicas



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo-INE. Encuesta Nacional de Salud de España, 2006.

Por grupos de edad, el porcentaje de hombres que dice haber consumido alcohol en los últimos 12 meses es mayor en los de mediana edad que en los más jóvenes. Para las mujeres el grupo más joven supera a todos los grupos.

Consumo de alcohol por sexo y grupo de edad

	Hombres		Mujeres
	72,78	65 y +	36,73
	81,07	45-64	56,97
	82,99	25-44	65,80
	77,15	16-24	67,60

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo-INE. Encuesta Nacional de Salud de España, 2006.

El consumo de tabaco y alcohol junto con el sobrepeso y la obesidad son factor de riesgo para un amplio número de enfermedades y problemas de salud: hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes de adulto, enfermedades coronarias, ciertos tipos de cáncer y muchas otras enfermedades crónicas. El porcentaje de población de 18 y más años que presenta obesidad se sitúa en el 15,4%. En población infantil de 2 a 17 años la obesidad se sitúa en el 8,9%.

Índice de masa corporal en adultos

	Ambos sexos	Mujeres	Hombres
Peso insuficiente (18,5-24,9 kg/m ²)	1,79	3,07	0,54
Normopeso (<18,5 kg/m ²)	45,71	52,33	39,27
Sobrepeso (25,0-29,9 kg/m ²)	37,13	29,41	44,65
Obesidad (≥30,0 kg/m ²)	15,37	15,19	15,55

Nota: Índice de masa corporal = [Peso (Kg)/Estratura (m) al cuadrado].

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo-INE. Encuesta Nacional de Salud de España, 2006.

Índice de Quetelet elaborado por el Instituto de Información Sanitaria.

Índice de masa corporal en población infantil

	Ambos sexos	Niñas	Niños
Normopeso o Peso insuficiente	72,39	74,17	70,68
Sobrepeso	18,67	17,09	20,19
Obesidad	8,94	8,74	9,13

Nota: Índice de masa corporal = [Peso (Kg)/Estratura (m) al cuadrado].

Se han utilizado los puntos de corte del Índice de masa corporal para sobrepeso y obesidad infantil publicados en: Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320: 1-6.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo-INE. Encuesta Nacional de Salud de España 2006. Índice de Quetelet elaborado por el Instituto de Información Sanitaria.

Morbilidad *Causas de hospitalización*

Las enfermedades del aparato circulatorio, el cáncer, las enfermedades del aparato respiratorio, las enfermedades del digestivo y las complicaciones de la gestación, parto y puerperio, constituyen las causas más frecuentes de altas hospitalarias en los hospitales de agudos del Sistema Nacional de Salud.

Capítulo	Mujeres		Hombres	
	%	Nº Casos	%	Nº Casos
Enfermedades infecciosas y parasitarias	1,57	30.028	2,62	43.775
Neoplasias	8,05	154.301	10,43	174.519
Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas y trastornos de la inmunidad	1,93	36.998	1,62	27.151
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,96	18.346	1,00	16.817
Trastornos mentales	1,75	33.612	2,46	41.241
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos sensoriales	2,98	57.026	3,34	55.901
Enfermedades del sistema circulatorio	11,13	213.159	16,77	280.644
Enfermedades del aparato respiratorio	7,94	152.182	14,42	241.295
Enfermedades del aparato digestivo	9,67	185.343	14,77	247.148
Enfermedades del aparato genitourinario	6,18	118.368	5,45	91.196
Complicaciones de la gestación parto y puerperio	25,87	495.626	—	—
Enfermedades de la piel y de los tejidos cutáneos	0,84	16.017	1,19	19.963
Enfermedades del aparato muscular y esquelético y de los tejidos conectivos	5,42	103.750	4,74	79.387
Anomalías congénitas	0,69	13.193	1,16	19.382
Determinadas condiciones con origen en el periodo perinatal	1,45	27.853	2,04	34.075
Síntomas, signos y estados mal definidos	3,57	68.451	5,06	84.660
Lesiones y envenenamientos	7,11	136.248	9,38	156.973
Anexo clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios	2,36	45.248	2,88	48.200
Otros	0,52	10.042	0,68	11.344
TOTAL		1.915.791		1.673.671

Nota: Para los fines de esta estadística, Sistema Nacional de Salud incluye hospitales públicos, hospitales de la red de utilización pública y hospitales con concierto sustitutorio. Excluidos hospitales psiquiátricos y hospitales de larga estancia.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Registro de altas de hospitalización (CMDB), 2006.

Enfermedades vacunables

La cobertura vacunal en España es elevada. La incidencia de enfermedades transmisibles prevenibles, como son el sarampión y la rubéola, es de 0,8 casos y 0,2 casos por 100.000 habitantes respectivamente, tasas sensiblemente inferiores a las correspondientes a la UE (1,6 y 6,1 casos por 100.000 habitantes).

La cobertura de la vacunación de la gripe en mayores de 65 años en la campaña 2006-2007 fue de 67,8%.

Cobertura vacunal

Poliomielitis	97,6
DTP	97,6
Hib	97,5
Meningococo C	97,1
Hepatitis B	96,6

En niños menores de 1 año

Sarampión/Rubeola/Parotiditis	96,9
Refuerzo Poliomielitis (*)	95,1
Refuerzo Difteria/Tos ferina/Tétanos (*)	95,1
Refuerzo <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (*)	95,1

En niños mayores de 1 año y menores de 2 años

(*) Refuerzo con una dosis.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. D.G. Salud Pública. Datos año 2006.

Según las notificaciones recibidas hasta el 31 de diciembre de 2007 en el Registro Nacional de Casos de Sida, se estima, tras corregir por retraso en la notificación, que en 2007 se diagnosticaron en España 1.464 casos de sida. Tras su cenit a mediados de la década de los 90, el número de casos notificados de sida ha experimentado un progresivo declive, de forma que los notificados en 2007 suponen un descenso del 78% respecto a los notificados en 1996, año previo a la generalización de los tratamientos antirretrovirales de gran actividad.

Desde el inicio de la epidemia en España se han notificado un total de 75.733 casos de sida.

SIDA

Salud materno-infantil

En el año 2006 nacieron en España 482.957 niños lo que supone una tasa cruda de natalidad de 10,9 por 1000 habitantes experimentando un cierto repunte frente a años anteriores. En 1996 el número de nacimientos fue de 362.626 con una tasa cruda de 9,2 por 1.000 habitantes.

El porcentaje de nacidos de madres de menos de 20 años es del 2,8% y el de nacidos de madres de 35 y más años es de 24,5%. Hace diez años estos porcentajes eran de 3,0% y 14,6% respectivamente.

España, con 3,78 fallecimientos infantiles por cada 1000 nacidos vivos, en 2005, es uno de los países con menor mortalidad infantil de toda la UE con un porcentaje de disminución del 91% en el periodo 1960-2005.

La mortalidad perinatal se sitúa en 4,9 muertes perinatales por 1000 nacidos vivos, con un porcentaje de disminución en el periodo 1960-2005 del 87%.

Accidentes

El número de víctimas por accidentes de tráfico en España presenta en una tendencia ascendente desde el año 1994, situándose en el año 2006 en una tasa de 330,0 por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a las víctimas por accidentes de trabajo, España presenta en 2005 un índice de frecuencia (accidentes por millón de horas trabajadas) de 35,3.

Mortalidad

En el año 2006 se produjeron en España 371.478 defunciones (de las que 194.154 correspondieron a hombres y 177.324 a mujeres), esto supone 15.877 menos que las registradas en 2005. La tasa bruta de mortalidad se situó en 843 fallecidos por cada 100.000 habitantes

Los datos muestran el perfil epidemiológico ya clásico en España, que se corresponde con el de los países de su entorno socioeconómico: enfermedades cardiovasculares y cáncer como primeras causas de muerte.

La mortalidad por enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en España, representa el 32,5% del total de defunciones.

Dentro del grupo de las enfermedades cardiovasculares las enfermedades isquémicas del corazón son la primera causa de muerte entre los hombres (con 21.194 defunciones) y las enfermedades cerebrovasculares la principal causa entre las mujeres (19.038 defunciones).

El segundo lugar de causas de muerte corresponde a los tumores, como responsables del 27,4% del total de fallecimientos. En el año 2006 se produjeron 101.669 defunciones por esta

Defunciones según causas de muerte

	Total	Hombres	Mujeres
Total de enfermedades	371.478	194.154	177.324
Enfermedades isquémicas del corazón	37.076	21.194	15.882
Enfermedades cerebro vasculares	32.887	13.849	19.038
Cáncer de bronquios y pulmón	19.513	16.879	2.634
Insuficiencia cardiaca	18.888	6.562	12.326
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	14.333	10.770	3.563
Demencia	11.215	3.639	7.576
Cáncer de colon	9.926	5.642	4.284
Diabetes mellitus	9.626	3.818	5.854
Enfermedad de Alzheimer	9.174	2.806	6.368
Neumonía	7.812	4.083	3.729
Enfermedad hipertensiva	6.675	2.120	4.555
Insuficiencia renal	6.035	3.003	3.032
Cáncer de mama	6.021	65	5.956
Cáncer de estómago	5.716	3.542	2.174
Cáncer de próstata	5.413	5.413	—

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE. Defunciones según causa de muerte datos provisionales año 2006. Se han considerado como causas de muerte más frecuentes las que tienen un peso relativo superior a 1,4% del total.

causa. En las mujeres, el cáncer de mama siguió siendo el más significativo con 5.956 defunciones, en los hombres el cáncer de bronquios y pulmón con 16.879 fallecidos es el primero en importancia seguido del cáncer de colón con 5.642 muertes. El cáncer de próstata fue responsable de 5.413 fallecimientos.

El tercer grupo de causas de muerte con más defunciones anuales es el de las enfermedades del sistema respiratorio. En el año 2006 causaron 39.486 fallecimientos.

