

## Fiebre Tifoidea Oral

### ¿Qué es la Fiebre Tifoidea?

Es una infección bacteriana aguda causada por **Salmonella tphi**, que cursa con fiebre, dolor de cabeza, malestar, anorexia, insomnio, en adultos y en jóvenes es más frecuente el estreñimiento, es necesario el tratamiento para evitar las complicaciones, incluso la muerte. Determinadas personas pueden convertirse en portadores.

### ¿Cómo se adquiere?

Se adquiere a través del consumo de alimentos o aguas contaminadas (El marisco recogido en fondos contaminados por aguas residuales, constituye una fuente importante de infección), o mediante el contacto directo con heces contaminadas, o bien al tomar crudas las frutas y/o verduras fertilizadas con excrementos humanos, o por la leche y los productos lácteos contaminados. Las moscas pueden contaminar los alimentos.

### ¿Cómo podemos prevenir la Fiebre Tifoidea?

Adoptando todas las precauciones necesarias para evitar el consumo de agua y alimentos contaminados y con la administración de vacuna

### ¿Dónde hay riesgo?

Aunque esta enfermedad se puede adquirir en cualquier lugar del mundo, el riesgo para los viajeros es bajo, excepto en zonas del norte y oeste de África, en el Subcontinente Indio, Sur de Asia, algunos países de América del Sur y en aquellos destinos donde existan microorganismos resistentes a antibióticos (ver mapa).

El riesgo está asociado a las malas condiciones higiénicas en relación con la preparación y manipulación de los alimentos, con el control de la calidad del agua de bebida y con aquellos lugares donde la eliminación de aguas residuales no se controla.



Distribución de la Fiebre  
Tifoidea Oral

# Vacuna Fiebre Tifoidea Oral

## ¿Quién debe vacunarse?

Los viajeros que se dirijan a zonas de alto riesgo. La indicación personalizada debe realizarse en un Centro de Vacunación Internacional

## ¿Cuándo debo vacunarme?

Al menos 2 semana antes del inicio del viaje.

## ¿Cuántas dosis son necesarias?

Tres dosis por vía oral, en tres días alternos.

## ¿Dosis de recuerdo?

Cada 3 años si el riesgo continua.

## ¿Quién no debe vacunarse?

Como norma general aquellas personas que presenten problemas médicos que contraindiquen la administración de esta vacuna, así como las personas que puedan tener contraindicaciones a los componentes de la vacuna.

El intervalo mínimo entre la administración de la última dosis de la vacuna y la toma de antibióticos, sulfamidas y los medicamentos antipalúdicos debe ser de 1 semana.

«La vacuna protege frente al riesgo de infección relacionado con la *Salmonella typhi*, pero no protege frente a otras especies de *Salmonellas*»

«Las personas vacunadas deben adoptar precauciones para evitar el consumo de alimentos y agua potencialmente contaminados»

Consulte con un  
Centro de  
Vacunación  
Internacional

[www.msps.es/cvi](http://www.msps.es/cvi)

901 400 100



MINISTERIO  
DE SANIDAD  
Y POLÍTICA SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE SALUD PÚBLICA  
Y SANIDAD EXTERIOR

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE SANIDAD EXTERIOR