

Vacuna Encefalitis Japonesa

¿Quién debe vacunarse?

Los viajeros mayores, de 1 año de edad, que se dirijan a zonas endémicas, si la estancia es prolongada y si se visitan principalmente zonas rurales y agrícolas especialmente durante las epidemias, así como también aquellos profesionales que por motivos de trabajo tengan que frecuentar zonas infectadas (veterinarios, biólogos, agricultores, etc...). La indicación personalizada debe realizarse en un Centro de Vacunación Internacional.

¿Dónde me puedo vacunar?

En los Centros de Vacunación Internacional.

¿Cuándo debo vacunarme?

Es necesario iniciar la pauta de vacunación al menos seis semanas antes de la partida, siendo conveniente que la última dosis se administre por lo menos 10 días antes de entrar en la zona endémica.

¿Cuántas dosis son necesarias?

De forma general son necesarias 3 dosis, los días 0, 7 y 30 por vía subcutánea; existiendo una pauta rápida.

¿Dosis de recuerdo?

Cada 2 años si va a continuar en zonas de riesgo.

¿Quién no debe vacunarse?

Como norma general aquellas personas que presenten problemas médicos que contraindiquen la administración de esta vacuna y en concreto las personas que han presentado hipersensibilidad a dosis anteriores o al tiomersal, conservante de la vacuna. Las mujeres embarazadas deben ser evaluadas por su médico.

¿Que reacciones pueden presentarse?

Puede aparecer reacciones locales leves como enrojecimiento, hinchazón así como fiebre, dolor de cabeza y malestar siendo poco frecuente la urticaria generalizada, la hipotensión y el colapso.

«Aunque la vacuna de la encefalitis japonesa es eficaz no olvide adoptar precauciones personales para evitar la exposición a las picaduras de los mosquitos utilizando ropa protectora y repelentes de insectos»

Consulte con un
Centro de
Vacunación
Internacional

www.msc.es/cvi

901 400 100



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD EXTERIOR

Encefalitis Japonesa

¿Qué es la Encefalitis Japonesa?

La encefalitis japonesa es una enfermedad vírica.

En la mayoría de las infecciones no aparecen síntomas, en los casos leves puede aparecer dolor de cabeza con fiebre o meningitis aséptica. En los casos graves los síntomas cursan de manera rápida y progresiva con dolor de cabeza, fiebre alta y signos meníngeos, pudiendo quedar secuelas neurológicas graves. Aproximadamente el 50% de los casos clínicos graves pueden fallecer.

¿Cómo se adquiere?

Se adquiere por la picadura de mosquitos infectados.

¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad?

Fundamentalmente adoptando precauciones personales para reducir la exposición a las picaduras de los mosquitos principalmente durante el atardecer y por la noche. En algunos casos puede estar indicada la vacunación

¿Dónde hay riesgo?

En algunos países asiáticos y ocasionalmente, en el norte de Australia, sobretudo en zonas de arrozales y de explotaciones porcinas. El riesgo varía según la estación del año (más alto durante el monzón), el tipo de alojamiento y la duración de la exposición (ver mapa).



Distribución de la Encefalitis
Japonesa